

NEPOREX[®] 2 SG

Larvicida contra las larvas de moscas en instalaciones ganaderas

Laboratorio

ELANCO VALQUÍMICA, S.A.

Forma farmacéutica

Granulado (Gran.)

Composición por g:

Ciromacina 2 %.

Propiedades farmacológicas

Actúa contra las larvas de moscas que se desarrollan en la gallinaza, estiércol, purín y restos de forraje en instalaciones ganaderas. Neporex[®]2 SG inhibe el crecimiento de las larvas de mosca impidiendo la transformación de larva a mosca.

Interacciones e incompatibilidades

No procede.

Indicaciones y especies de destino

En General: Larvicida moscas.

Contraindicaciones

No procede.

Efectos secundarios

No procede.

Vía de administración

Espolvoreo-esparcido en seco, pulverizado y regado.

- Neporex® 2 SG: Granulado para aplicar en seco o disuelto en agua, se aplica sobre el estiércol, purín, o restos de alimentación depositados en el suelo de explotaciones ganaderas de porcino, avícolas, vacuno, terneros, ovino y caprino.

Posología

En general en establos: Dosis para tratar una superficie de 10 m² de estiércol.

Esparcido en seco: 250 g.

Pulverizado: 250 g/1 a 4 litros agua.

Regado: 250 g/10 litros agua.

- Esparcir, pulverizar o regar sobre el estiércol, purín o restos de forraje, en las zonas donde no patean los animales: Periferia del establo, rejillas de fosas y fosas.

Precauciones especiales

Lea la etiqueta antes de usar el producto.

Tiempo de espera

No procede.

Modo de conservación

Conservar el producto cerrado y en su envase original, en lugar seco y fresco.

Observaciones

Plaguicida de uso ganadero.

Presentación

Envase con 5 kg.

Reg. Nº

8712