

INFORMACIÓN TÉCNICA

DISOLYT

pienso complementario dietético oral en polvo efervescente

ESPECIES DE DESTINO

Terneros y lechones.

INSTRUCCIONES DE USO

Disolver los 100 gramos del sobre en 2 litros de agua templada (35-40°C). El polvo de DisoLyt se disuelve rápidamente sin necesidad de mezclarlo.

Terneros:

Administrar un sobre de DisoLyt al ternero 2 veces al día durante 1-3 días. Se recomienda continuar la alimentación con leche/lactoreemplazante durante el tratamiento para asegurar una suficiente ingesta de energía. El ternero puede recibir la leche/lactoreemplazante 1 hora después del tratamiento. Suministrar un máximo de 250 gramos por ternero y día.

Lechones:

Ofrecer al lechón libre acceso a la solución. El bebedero debe vaciarse al menos una vez al día. La solución debe ofrecerse a los animales hasta que se detenga la diarrea. Suministrar un máximo de 50 gramos por cerdo y día.

COMPOSICIÓN

Dextrosa, Bicarbonato sódico, Cloruro sódico, Cloruro potásico.

ADITIVOS

Tecnológicos: Ácido cítrico (E-330)

Organolépticos: Glicina (2b, Flavis number 17.034), Saborizantes (2b)

Zootécnicos: 4b1707, *Enterococcus faecium* DSM 10663 NCIMB 10415 4,2 x 10⁹ CFU/kg

COMPONENTES ANALÍTICOS

Proteína bruta (10,9%), Aceites y grasas brutos (0,2%), Ceniza bruta (16%), Fibra bruta (0,2%), Sodio (5,1%), Potasio (1,5%), Cloruros (3,8%).

CANTIDAD NETA

Caja con 25 sobres de 100 g.

Conservar en un ambiente seco y fresco a temperatura inferior a 25°C.

Fecha de durabilidad máxima

18 meses después de la fecha de fabricación.

Fabricado por:

R2 Agro A/S, Office: Mimersvej 1
Prod: Odinsvej 21 + 25
DK-8722 Hedensted
Autorización nº: α208-G756042

Distribuido por:

Industrial Veterinaria, S.A.
A LIVISTO Company
Esmeralda, 19
08950 Esplugues de Llobregat
(Barcelona) España
αESP08100210

LIVISTO